

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 40-00-74)
(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MORBIHAN, ORNE)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Route de Fougères - RENNES (face à l'Hippodrome)
C. C. P. RENNES 9404-94

ABONNEMENT ANNUEL
25 F.

SUPPLEMENT N° 2 AU BULLETIN N° 91 -

29 AVRIL 1968

AVERTISSEMENTS

POMMIER - POIRIER

- TAVELURES : Les risques de contamination sont actuellement très graves du fait de l'accroissement très rapide des surfaces foliaires, principalement sur poirier, des nombreuses projections d'ascospores et des pluies importantes de ces derniers jours.

Effectuer un nouveau traitement dès que possible.

INFORMATIONS

ARBRES FRUITIERS

- ACARIENS : Dans les vergers où des dégâts ont été observés en 1967, examiner de près la végétation afin de se rendre compte du niveau de population. En cas d'infestation notable, prévoir un traitement après la chute des pétales avec l'un des produits indiqués dans l'édition spéciale.
- RHYNCHITES COUPE-BOURGEOIS : Ces insectes sont nuisibles surtout dans les pépinières et les jeunes plantations. Dans les situations où ils causent habituellement des dégâts, prévoir un traitement, dès le début du développement des pousses, avec l'un des insecticides préconisés contre les Anthonomes dans l'édition spéciale.

TOMATE DE SERRE

Il est possible de limiter considérablement les risques de maladies cryptogamiques sur la tomate en agissant sur les facteurs qui règlent le climat de la serre. Nous conseillons :

- de maintenir la température nocturne au moins égale à 15°.
- d'arroser chaque fois que possible par beau temps chaud et ensoleillé, uniquement au cours de la matinée, de façon à obtenir une chute rapide de l'hygrométrie.
- d'aérer au maximum après arrosage.

- si un ressuyage naturel ne peut être obtenu, d'accélérer le chauffage pour provoquer une chute momentanée de l'hygrométrie saturée.
- d'aérer suffisamment tôt le matin pour faire tomber l'hygrométrie.
- de fermer les ouvertures assez tôt le soir pour économiser des calories
- de bassiner (arrosage de 30 secondes) au moins à deux reprises (11 H et 14 H) par journée fortement ensoleillée pour éviter que les tomates ne fatiguent par excès d'évaporation.

BETTERAVE POTAGERE

- CARENCE EN BORE : Des dégâts dus à une carence en Bore ont été observés chez plusieurs producteurs de la région. Des gerçures et parfois des crevasses assez profondes se remarquent dans l'écorce et les tissus sous-jacents de la zone située un peu au-dessous de la surface du sol.

Comme remède, apporter, avant mise en place de la culture, 20 kg de Boracine à l'hectare.

CHOUX

- ALTISES - MILDIOU : Penser à lutter contre ces parasites dès la levée.

CYPRES

Depuis quelques années, des pucerons (*Cupressobium cupressi*) causent des dégâts importants dans notre région, notamment sur cyprès Lambert, courant Mai. Les insectes se groupent en colonies abondantes sur rameaux. Ils sont difficiles à observer car leur couleur se confond avec celle du bois. Rapidement, les feuilles des rameaux attaqués jaunissent puis se dessèchent.

Dès que les premiers symptômes de décoloration apparaissent, repérer les colonies et les détruire par pulvérisation d'un insecticide de contact tel que le Lindane.

POMME DE TERRE DE PRIMEUR

- MILDIOU : Nous rappelons que le concours pour la détection des premières taches est toujours ouvert.

L'Ingénieur chargé des
Avertissements Agricoles,

G. PAITIER.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

J. DELOUSTAL.